

# Mykoplazmatyczne zapalenie płuc

**Źródło zakażenia.** Wyłącznie człowiek; wydzielina dróg oddechowych osób chorych i ozdowieńców

**Drogi szerzenia.** Zakażenie następuje wyłącznie drogą powietrzną- kropelkową lub pyłową

**Wrota zakażenia.** Drogi oddechowe.

**Okres wylęgania.** Od 9 do 21 dni, najczęściej 14 dni.

**Objawy mykoplazmatycznego zapalenia płuc:**

- suchy kaszel,
- lekko podwyższona temperatura ciała (37-38 stopni Celsjusza),
- bóle różnych partii mięśni,
- ogólne osłabienie organizmu,
- brak apetytu.

**Przyczyny mykoplazmatycznego zapalenia płuc**

Mykoplazmatyczne zapalenie płuc to schorzenie, które roznosi się drogą kropelkową, czyli np. przez kichanie. Okres wylęgania się bakterii w organizmie trwa od 2 do nawet 3 tygodni. Na tą odmianę zapalenia płuc szczególnie narażone są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które nie posiadają jeszcze odpowiedniej odporności organizmu.

**Mykoplazmatyczne zapalenie płuc – leczenie**

Leczenie mykoplazmatycznego zapalenia płuc obejmuje przede wszystkim antybiotykoterapię. Dzięki niej możliwy jest odpowiednio szybki powrót do zdrowia. Bardzo ważna jest konsultacja z lekarzem.

Każdy przedłużający się kaszel, stany podgorączkowe i odkrztuszanie płwociny przez dłuższy czas powinno być poddane specjalistycznej diagnostyce. Odpowiednie leczenie i wprowadzenie terapii we właściwym czasie zminimalizuje ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych oraz konsekwencji z powodu **nieleczonej infekcji Mycoplasma pneumoniae**.

**Najskuteczniejszą metodą zapobiegania szerzeniu się choroby jest izolowanie chorych przez 4 tygodnie. Przestrzeganie zasad higieny, stosowanie zabiegów czystościowych i dezynfekcyjnych przecina drogi szerzenia choroby.**